

Le dessous est d'un gris cendré dans les deux sexes, avec une multitude de points noirs ocellés, ainsi qu'une rangée de lunules fauves sagittées, bordées intérieurement par un chevron noir, et s'appuyant extérieurement sur une rangée d'yeux noirs à iris blanc.

Le corselet et l'abdomen sont de la couleur des ailes; la poitrine est bleuâtre, et le ventre blanchâtre.

Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec l'extrémité de la massue roussâtre.

La chenille, selon M. Duponchel, est entièrement verte, et vit sur la luzerne cultivée.

La chrysalide est d'un brun jaunâtre avec les incisions ferrugineuses.

L'insecte parfait écôt en juin, pour reparaitre en août et septembre; on le rencontre abondamment dans toutes les prairies.

54. ARGUS ADONIS, FAB. GOD. BOISD. Pl. XI, fig. 3 et 4.

Le mâle est en dessus d'un bleu d'azur, avec la frange blanche, entrecoupée de noirâtre. La femelle a les ailes d'un brun noir, et sablées de bleu dans leur milieu; les supérieures offrent sur le disque un petit croissant noir, surmonté de blanc, et les inférieures, une rangée de lunules fauves s'appuyant chacune extérieurement sur un point noir, cerclé de bleu.

Le dessous des quatre ailes est d'un gris cendré dans les deux sexes, avec la base verdâtre et une multitude de gros points noirs ocellés, placés sur le disque. Les supérieures, ont de plus que dans *Alexis*, deux points ocellés placés vers la base, et se tenant

nos contrées; nous appelons donc l'attention de MM. les amateurs sur cette espèce, et les prions de nous communiquer le résultat de leurs observations. M. le Docteur Schreiner possède un hermaphrodite de l'*Alexis*; nous nous proposons d'en donner le dessin et la description dans un supplément. Nous l'avons communiqué tout récemment à M. Alexandre Lefebvre, secrétaire de la société entomologique de France, pour le faire figurer dans les annales de la société.

52. ARGUS AGESTIS, ESP. GOD. BOISD. Pl. x, fig. 6.

Le dessin est semblable dans les deux sexes; le dessus des quatre ailes est d'un brun noirâtre, avec une rangée de lunules fauves le long de leur bord postérieur; le disque des supérieures est marqué d'un arc noir.

Le dessous est d'un gris cendré, avec une multitude de points noirs cerclés de blanc. La rangée de lunules fauves diffère de celle du dessus, en ce qu'elle y est plus prononcée et qu'elle s'appuie intérieurement et extérieurement sur des points noirs. La frange est grisâtre aux ailes supérieures, blanchâtre aux inférieures.

Le corselet et l'abdomen sont d'un brun noirâtre.

Les antennes sont noires, annelées de blanc, avec l'extrémité de la massue fauve.

La chenille n'a encore été figurée, à notre connaissance, par aucun auteur.

L'insecte parfait paraît en mai, juillet et août; on le rencontre abondamment partout, dans les bois, les prairies et le long des chemins.

53. ARGUS ALEXIS, (1) FAB. GOD. BOISD. Pl. XI, fig. 1 et 2.

Le mâle est en dessus d'un bleu tirant légèrement sur le violet, avec la frange entièrement blanche. Le dessous des ailes de la femelle est d'un brun noirâtre, saupoudré de bleu à la base, avec la frange légèrement grisâtre, un arc central sur les supérieures, ainsi qu'une rangée de lunules fauves le long du bord postérieur des quatre ailes.

(1) L'individu figuré ici, est le véritable *Thersites*, Boisd. (collection). Cet *Argus* a été confondu jusqu'à présent avec l'*Alexis*, et n'en diffère que par l'absence de deux points ocellés placés près de la base des ailes supérieures. On le rencontre aussi communément dans le midi de la France que l'*Alexis*. Il est à présumer qu'il n'est pas étranger à

*

