

wordt rekening gehouden met de bij ons algemeen bekende benamingen uit de fauna's van Lameere en Seguy. Zo wordt b.v. de naam Eristalis Latr. niet vervangen door Tubifera, maar deze laatste naam is tussen haakjes aangegeven na Eristalis : Eristalis Latr. (Tubifera).

Samen met de verzameling Bastin heeft de Vereniging voor Entomologie van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen een prachtig en wetenschappelijk overzicht van de Diptera van onze gewesten. Wij danken de heer R. Van averbeke voor de hulp, verleend bij het schrijven van de kaartjes en het rangschikken van de dozen.

V. Naveau

---

## LIJST VAN LEPIDOPTERA UIT DE ANTWERPSE OMGEVING

### ADDENDUM 8

Familie : Noctuidae

Subfamilie : Plusiinae

#### **Syngrapha interrogationis L.**

Hulshout : 1 ♂ gevangen op 4-8-1974 door K. Janssens (Antwerpen).

S. interrogationis, vooral bekend van de hoogvenen en schaduwrijke wouden in het noordoosten van Midden-Europa en in bergachtige gebieden, wordt zeer zelden waargenomen in het westen van België. Voor ons land ligt zijn vlieggebied voornamelijk in de Hoge Venen : omgeving van Spa, Hockay, Eupen. Buiten dit gebied wordt de vlinder zelden gevangen. Het betreft steeds zwervers. Zo werden in 1959 ex. gevonden te Tilff en te Esneux. Ook te Mont-sur-Marchienne (bij Charleroi) werd door Hecq een ♂ gevangen op 28-7-1972.

In Nederland wordt de soort af en toe gemeld. Het eerste Nederlandse ex. dateert van in 1919. Het volgende ex. werd eerst in 1955 gevonden. Sedertdien verschijnt hij ook in de trekvlinderverslagen. 1959 blijkt voor de soort een gunstig jaar te zijn geweest, niet alleen voor Nederland maar ook voor Denemarken (cat. Lempke, 13de supplement). Ook de bovengemelde vangsten te Tilff en te Esneux kunnen dit bevestigen. De voornaamste voedselplanten van de rups zijn bosbessen, vooral Vaccinium uliginosum, maar ook V. myrtillus.

Subfamilie : Hypeninae

**Herminia cribrumalis Hbn.**

Berlaar : 2-7-1974, 1 ♂ (K. Janssens).

Sedert de eerste Belgische vangst te Koksijde door V.d. Gucht (Derenne, supplement 1934) wordt de soort maar zelden waargenomen. Dodinval vond de vlinder in het Zoniënwoud in 1964 (Linneana Belgica). H. cribrumalis is een bewoner van vochtige plaatsen. In Nederland wordt het dier regelmatig gevangen. Tot nu toe werd de vlinder in Noord-Brabant (Nederland) gevonden op negen plaatsen (Cat. Lempke en supplement).

Familie : Geometridae

Subfamilie : Sterrhinae

**Sterrha inquinata Scop. (herbariata F.)**

Nogmaals een vlindersoort gevangen door ons onvermoeibaar medelid K. Janssens! Tussen enkele interessante vlinders, te Berlaar op 15-8-1974 gevangen, bevond zich één ex. van de bovengenoemde soort.

Het is wel eigenaardig dat ik het insect in geen enkele Antwerpse verzameling heb aangetroffen, niettegenstaande het feit dat Lambillion, Derenne en Lhomme vermelden : "Belgique, presque partout". Wat Nederland betreft vermeldt cat. Lempke enkele vindplaatsen in het zuiden van het land. In Noord-Brabant is de soort enkel vermeld van Breda. Volgens het 14de supplement (1967) werd de vlinder na 1947 nog maar één keer in Nederland waargenomen (in Limburg).

A. Janssen

---

**ANCYROPHORUS AUREUS Fauvel**

(Coleoptera, Staphylinidae)

Hiermede meld ik de vondst van twee exemplaren van de soort Ancyrophorus aureus Fauvel, (det. C.J. Segers) in de "Grotte de Ste. Anne" te Tilff op 12-5-1974. Beide insecten vertoefden in het midden van een stilstaande plas op het hoogste niveau van de grot, ver verwijderd van de veel lager stromende rivier.

V. Naveau