

DIPTERA : INHEEMSE VANGSTEN I.

Louis MARNEF

Tachinidae : Phasiinae : Phasiini :

Alophora hemiptera F. 2 ♂, Jamoigne, 03-08-1953, op Heraclium sphondylium (C. SEGERS leg.); 1 ♂, Orval, 21-07-1961 (C. SEGERS leg.); 1 ♂, Ethe, 19-08-1981 (C. SEGERS leg. et det.).

Bovenstaande Diptera werden me geschonken ter determinatie door onze ere-voorzitter, de heer C. SEGERS, waarvoor mijn beste dank. De eerste drie exemplaren werden door de schrijver gedetermineerd, de laatste door de heer SEGERS zelf.

Alle soorten (Xysta ?) van de Phasiini zijn parasieten van Heteroptera, speciaal van de Pentatomoidea, wijfjes ogenschijnlijk uitgekozen. Het ei wordt op het integument van de gastheer geplakt of in het integument geïnjecteerd door middel van een steker (Alophora). De volwassen larven verlaten de gastheer voor het verpoppen, waarbij de wants dikwijls overleeft voor enkele dagen. De gastheren zijn onbekend (VAN EMDEN). De soorten komen voor op bloemen, vooral op Umbelliferae en op Achillea. De vroege stadia zijn nog onbekend (LUNDBECK). Bovenstaande exemplaren bevinden zich in de verzameling van de schrijver.

Literatuur :

LUNDBECK, W., 1927 : Diptera Danica, deel VII : 90-100.

VAN EMDEN, F.I., 1954 : Handbooks for the Identification of British Insects, X (4a) : 27.

L. MARNEF : Fakkelsestraat 45, B-2710 HOBOKEN.
