

WEIGT, H.J., 1978. Die Blütenspanner Westfalens (Lepidoptera, Geometridae). Teil 3. Morphologie und Anatomie. Naturw. Mitt. Dortmund 12 : 9-77.

Summary : The author mentions a new Lepidoptera species for the Belgian fauna : Eupithecia actaeata Walderdorff (Geometridae). One male was taken at Belvaux (prov. Namur) on June 4th, 1980. The caterpillar feeds on Actaea spicata which occurs only in the southern half of Belgium.

Résumé : L'auteur prit un mâle d'Eupithecia actaeata Walderdorff (Geometridae), à Belvaux (prov. Namur) le 4 juin 1980. C'est une espèce nouvelle pour la faune belge. La chenille se nourit des feuilles d'Actaea spicata, une plante qui ne se trouve que dans la partie méridionale de la Belgique.

W.O. DE PRINS : Diksmuidelaan 176, B-2600 ANTWERPEN;

NIEUWE VINDPLAATS VAN CONINOMUS BIFASCIATUS

Reitter

(Coleoptera, Lathridiidae)

(R. DALL'ASTA)

Bij het prepareren van enkele Lathridius sp. en Enicmus sp., deels gezeefd uit wilgenmalm, deels uit detritus van Typha, werd mijn aandacht getrokken door een bleekgele Coninomus die ik voordien nog nooit had aangetroffen in het Krekengebied. Bij nader inzicht betrof het de recent geïmporteerde C. bifasciatus. Het diertje bezet dezelfde ecologische niche als de overige Lathridiidae, en voedt zich met rottend plantaardig materiaal. Zijn predatoren zijn doorgaans Carabidae en Staphylinidae (genera : Pterostichus, Philonthus en misschien Tachyporus) die samen in het zeefsel voorkamen.

Vindplaatsen : rietgordel van de Boerekreek (16-04-1980)
drinkplas in een weide (mei en juni 1982)
(Krekengebied, provincie Oost-Vlaanderen)

R. DALL'ASTA : Zonnebloemstraat 25, B-9900 EEKLO.
