

possible through a grant of the Uyttenboogaart-Eliassen Stichting, Amsterdam, Netherlands.

Bibliography

Zimmerman, E.C., 1958. Insects of Hawaii 8 : *Lepidoptera : Pyraloidea* 1-VIII, 1-456, Honolulu.

Korte mededelingen

Rheumaptera cervinalis SCOPOLI (Lepidoptera : Geometridae)

Door het artikel van A. RIEMIS (*Phegea* 15 : 191-193) begon ik eraan te twifelen of mijn dieren van *Triphosa dubitata* L. wel juist gedetermineerd waren, aangezien in de woonwijk 'De Vlierkouter' in Hamme (Oost-Vlaanderen) sinds vijftien jaar *Mahonia aquifolium* in verschillende voortuintjes is aangeplant. Inderdaad, drie opgezette exemplaren behoren tot *Rheumaptera cervinalis* SCOPOLI. Deze spanners werden telkens toevallig aangetroffen rustend op een muur op 10.IX.1984, 10.V.1985 en 24.IV.1987. Tot nu toe werden geen lichtvangsten verricht in deze woonwijk zodat we hoopvol uitkijken naar het voorjaar van 1988.

Ondertussen had ik wel in 1987 in functie van mijn skriptie ('Dag- en nachtvlinders in Hamme') in andere gebieden een lichtval geplaatst. Zo vonden we ook in het natuurgebied 'De Bunt' in Hamme op 10.VIII.1987 een mannetje van *R. cervinalis* in de lichtval. Gezien de soms nogal rare vliegtijden en teneinde de juistheid van de determinaties te kunnen bewijzen, werden genitaalpreparaten gemaakt door H. LIEVENS met bevestigend resultaat.

(H. KINDERS, Reuzeweg 55, 9160 Hamme).

Kortschildkevers (Staphylinidae)

De soort *Paederus riparius* LINNAEUS is allerminst zeldzaam, zoals het artikeltje door M. LODEWYCKX (*Phegea* 16 : 18) zou doen uitschijnen. Zij werd volgens mijn Catalogus niet 5x maar wel 20x na 1950 waargenomen. Men dient immers ook de nieuwe waarnemingen in de Catalogus te beschouwen. Op bijna alle vernoemde nieuwe plaatsen werden verscheidene tot tientallen exemplaren verzameld.

De soort *Lesteva sicula* ERICHSON werd volgens de Catalogus niet 4x, maar wel 11x na 1950 waargenomen. Na de publikatie van mijn Catalogus zijn nog 15 nieuwe vindplaatsen bekend geworden, wat een totaal geeft van 26 vindplaatsen na 1950. Op de in de Catalogus vermelde vindplaatsen was de soort meestal niet zeldzaam. Ze treedt vooral op in de herfstperiode, en blijft zelfs bij sneeuwval en vorst actief.

(R. SEGERS, Rijweg 134, 2658 Puurs).

Hyles lineata livornica (ESPER, 1780) in de kollekties van het K.B.I.N. te Brussel

In de kollekties van het K.B.I.N. te Brussel bevinden zich 25 exemplaren van *Hyles lineata livornica* (ESPER, 1780) afkomstig uit België. De vlinders zijn alle in goede staat en worden bewaard in één enkele doos. Twee exemplaren zijn vergezeld van onduidelijke etiketten; ze werden wellicht gevangen vóór 1900. Dan is er een vlinder die gevangen werd op 20.VIII.1915 te Longchamps (Namen). Het oorlogsjaar 1943 moet voor *H. lineata* zeer gunstig geweest zijn. Op 9.VI.1943 werd een bevrucht wijfje ontdekt in het Dudenpark van Vorst-Brussel, dat in het bezit kwam van ene SANDRAS. Deze verzamelaar bekwam hiervan een aantal eitjes die tussen 12 en 25.VIII.1943 18 imago's opleverden. In het Arboretum te Tervuren (Brabant) werd op 10.VI.1943 een tweede *H. lineata* gevangen. Een derde exemplaar werd gevonden op 28.VI.1943 te Brussel (Sint-Pieters-Woluwe?) en kwam in het bezit van L. BERGER. Tenslotte bevat de verzameling nog een vlinder die op 2.VIII.1946 te Linkebeek (Brabant) werd gevangen. Het beste trekvlinderjaar van deze eeuw, nl. 1947, liet in de kollekties van het K.B.I.N., eigenaardig genoeg, geen enkel spoor na. Het is duidelijk dat *H. lineata* een zeer onregelmatige trekvlinder is.

(W. TROUKENS, Van Souststraat 502, 1070 Anderlecht).