

## Korte mededelingen

### *Myopa vicaria* WALKER : een nieuwe soort voor België (Diptera : Conopidae)

Op 18 maart 1990 ving ik in het natuurreservaat «Waelenhoek» te Niel (Antwerpen) 1 ♂ *Myopa vicaria* WALKER. Volgens VAN VEEN (1984) is deze soort in ons land nog niet aangetroffen. Het exemplaar werd met veel moeite en hoog boven de grond ( $\pm 4$ m) gevangen op de mannelijke bloemen van geoorde wilg (*Salix aurita* L.).

Blijkbaar is deze vlieg overal zeldzaam want in Nederland is ze alleen bekend van Kralo en Eindhoven (VAN VEEN l.c.) en in Engeland van Suffolk (COLLIN 1950). Toch gaat het om een circumpolaire soort want ze is gemeld uit Zweden (RINGDAHL 1945) en Canada (SMITH 1959).

Waarschijnlijk is ze in België zo lang onbekend gebleven omdat ze zeer moeilijk te vangen is wegens de korte vliegperiode (gewoonlijk april) en omdat ze blijkbaar vliegt op bloeiende bomen (en dus relatief hoog).

### Literatuur

- Collin, J.E., 1960. The British species of *Myopa* (Diptera : Conopidae). - *Entomologist's mon. Mag.* 95 : 145-151.
- Ringdahl, O., 1945. En för Sverige ny art av släktet *Myopa* Fabr. (Dipt.). - *Opusc. Ent.* 10: 146-147.
- Smith, K.G.V., 1959. The distribution and habitats of the British Conopidae (Dipt.). - *Trans. Soc. Br. Ent.* 13 : 113-136.
- Veen, M. van, 1984. De Blaaskopvliegen en Roofvliegen van Nederland en België. Jeugdbonds-uitgeverij, 5de gewijzigde druk, 52 p.

(G. Van de Weyer, Unolaan 69, B-2620 Hemiksem)

### *Chrysopilus luteolus* (FALLÉN, 1814) wél in Nederland (Diptera : Rhagionidae)

In een recente publikatie maakte VAN DE WEYER (1990) melding van het ontbreken van *Chrysopilus luteolus* (FALLÉN, 1814) in Nederland. Hierbij geeft hij de publikatie van VAN DER GOOT (1985) als bron. Volgens dit werk ontbreekt de soort in België en Luxemburg, maar komt ze wel degelijk in Nederland voor. VAN DER GOOT geeft een aantal van 18 vindplaatsen, waarvan de meeste in het binnenland en dan vooral in de provincie Drente. Om het voorkomen van *C. luteolus* in Nederland te vergelijken met het voorkomen in België is de door VAN DER GOOT genoemde vindplaats de Nederheide bij Valkenswaard (Noord-Brabant) het interessantste. Deze vindplaats is slechts ruim 30 km ten noordoosten van Mol (Antwerpen) en ruim 50 km ten noordoosten van Averbode (Brabant), de twee door VAN DE WEYER genoemde Belgische vindplaatsen.

Zelf heb ik *C. luteolus* drie maal verzameld, telkens in vegetaties, die kortweg als zoomvegetaties beschreven kunnen worden. Ik sleepte één mannetje bij Gasteren (Drente) in de zogenaamde maden van Het Gasterensche Diep. Maden zijn extensief beheerde oeverlanden van de Drentse beken. Het exemplaar werd gesleept in de overgangsvegetatie van de grazige vegetatie naar een houtwal. De twee overige exemplaren heb ik verzameld in mijn woonplaats Wageningen (Gelderland), ook bij de overgang van houtwal naar grazige vegetatie, maar nu op de laagste bladeren van de struiken. Het eerste exemplaar, een wijfje, werd verzameld vlak bij een composthoop. Het tweede exemplaar was een mannetje. De verzameldata waren resp. 23.VII.1988, 3.VIII.1988 en 8.VIII.1988.

### Literatuur

- Goot, V.S. van der, 1985. De snavelvliegen (Rhagionidae), roofvliegen (Asilidae) en aanverwante families van Noordwest-Europa. - *Wetenschappelijke Mededeling K.N.N.V.* 171 : 1-66.
- Weyer, G. Van de, 1990. *Chrysopilus luteolus* FALLÉN, 1814 : tweede waarneming voor België (Diptera : Rhagionidae). - *Phegea* 18 : 43.

(P.L.Th. Beuk, p.a. Dahliastraat 20, NL-1616 EC Hoogkarpsel, Nederland)