

# De Aosta-vallei: een paradijs voor lepidopterologen, addendum 9 (Lepidoptera) \*

Marcel Faquaet

In 1993 trok ik van 7 tot en met 21 augustus naar de Aosta-vallei om er nachtvlinders te observeren. Ik bezocht voor het eerst 's nachts de Val di Rhêmes en meer bepaald Thumel, aan het einde van deze prachtige vallei die gedomineerd wordt door de Rifugio Benevolo. Men vindt er typische alpenbiotopen met veel marmotten. Ik verzamelde op volgende plaatsen en data:

Evian, 1000 m, 7, 10 en 15 augustus  
Clavel, 1300 m, 8, 11 en 17 augustus  
Thumel, 2100 m, 9 en 16 augustus  
Vens-Hoog, 1850 m, 12 augustus  
Avise, 900 m, 13 augustus  
Cerellaz 1200 m, 19 augustus  
Col de Joux, 2000 m, 18 augustus

Van de waargenomen nachtvlindersoorten worden alleen deze vermeld die nog niet eerder door mij waargenomen zijn in de Aosta-vallei.

\* *Entephria nobiliaria* Herrich-Schäffer: 1 ex. te Clavel en 2 ex. te Thumel. Volgens Forster & Wohlfahrt (1981) vliegt *E. nobiliaria* in de Alpen vanaf 500m tot boven 2300 m. In de diepere dalen is de soort zeer lokaal en vanaf 1000 m meer verbreed en op bepaalde plaatsen niet zeldzaam. De vliegtijd is door deze auteurs niet opgegeven. Volgens Rappaz (1979) verschilt de vliegperiode al naargelang de hoogte van einde juni tot einde september. Het is volgens deze auteur een nogal zeldzame soort in de Alpen.

*Perizoma verberata* Scopoli: 1 ex. te Thumel en 1 ex. op de Col de Joux. Volgens Forster & Wohlfahrt (1981) is het een zeer verspreide en gewone soort in de Alpen. De dieren vliegen tussen 600 m en 2500 m van einde juni tot midden augustus. Volgens Rappaz (1979) komt *P. verberata* van 1300 m tot boven 2000 m voor en is de soort zeer gewoon in Wallis.

*Hylaea fasciaria* Linnaeus: 1 ex. op de Col de Joux. Volgens Forster & Wohlfahrt (1981) vliegt deze soort in de Alpen tot ca. 1900 m in twee generaties van mei tot begin oktober en leven de rupsen op sparren. Volgens Rappaz (1979) zijn er in Wallis ook twee generaties: mei-juni en juli-augustus. Volgens deze auteur is het een nogal gewone soort, behalve in het gebergte waar ze zeer zeldzaam is. De rupsen leven volgens hem op dennen, sparren en lorken.

*Chersotis andereggi* Boisduval: 5 ex. te Thumel. Volgens Forster & Wohlfahrt (1971) vliegt deze soort in de Alpen tussen 1500 m en 2500 m in juli en augustus. De vlinders zouden overdag vliegen en graag op bloemen zitten, maar ze komen ook 's nachts naar licht. Volgens Rappaz (1979) is de soort in de Alpen te vinden tussen 1200 m en 2000 m vanaf juli tot september.

*Platyperigea albina* Eversmann: 3♂ en 1♀ te Vens-Hoog. De nominaatvorm vliegt in Rusland. In de Alpen vliegt de vorm *rougemonti* Spuler. Volgens Forster & Wohlfahrt

\* Zie *Phegea* 15: 47-59, 91-107, 131-144, 195-208; 16: 85-92; 17: 27-30, 145-159; 19: 39-42, 113-116; 20: 69-73; 21: 65-69, 137-139.

(1971) vliegt de soort in Wallis tot ongeveer 2000 m hoogte tijdens juli en augustus. Volgens Rappaz (1979) vliegt ze in twee generaties: april-mei en juli-september tot op ca. 1600 m hoogte.

*Eublemma purpurina* Denis & Schiffermüller: 2 ex. te Evian. Volgens Forster & Wohlfahrt (1971) vliegt de soort in de zuidelijke alpendalen in twee generaties: mei-juni en augustus-september. Rappaz (1979) vermeldt de soort uit Zwitserland alleen van Wallis en ze is er zeldzaam en lokaal van juni tot augustus.

*Bena prasinana* Linnaeus: 1 ex. te Evian. De soort vliegt volgens Forster & Wohlfahrt (1971) in de Alpen tot 1500 m in twee generaties: van begin mei tot augustus. Rappaz (1979) vindt de soort gewoon in Wallis van juni tot augustus.

*Catocala sponsa* Linnaeus: 1 ex. te Clavel. Volgens onze waarnemingen is *C. sponsa* een zeer zeldzame verschijning in de Aosta-vallei. Volgens Forster & Wohlfahrt (1971) is de soort in de Alpen te vinden tot ca. 1000 m in eikebossen (de rupsen leven op eik). Volgens Rappaz (1979) is *C. sponsa* te vinden in juli en augustus op de lagere hellingen en is het geen gewone soort in Wallis.

### Dankwoord

Mijn dank gaat uit naar de heren burgemeesters van Saint-Pierre en Rhêmes-Notre-Dame voor de toelating om de niet-verharde wegen te gebruiken boven respectievelijk Vetan en Thumel, naar Dr F. Hellmann die me enkele keren vergezelde tijdens de nachtwaarnemingen en naar de heren F. Bolland en W. De Prins voor het determineren van enkele moeilijke soorten.

### Literatuur

- Forster, W. & Wohlfahrt, Th., 1971. *Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Band IV Eulen (Noctuidae)*. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.  
Forster, W. & Wohlfahrt, Th., 1981. *Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Band V. Spanner (Geometridae)*. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart.  
Rappaz, R., 1979. *Les papillons du Valais*. Ed. Pillet, Martigny.