

# Description of *Cinetus nyx* sp. n. from Norway (Hymenoptera: Diapriidae)

Peter Neerup Buhl

**Abstract.** *Cinetus nyx* sp. n. (♀) from Norway is described and figured. It is close to *C. proclea* Nixon, 1957.

**Samenvatting.** Beschrijving van *Cinetus nyx* sp. n. uit Noorwegen (Hymenoptera: Diapriidae)  
*Cinetus nyx* sp. n. uit Noorwegen wordt beschreven en afgebeeld. Deze soort is het nauwst verwant aan *C. proclea* Nixon, 1957.

**Résumé.** Description de *Cinetus nyx* sp. n. de Norvège (Hymenoptera: Diapriidae)  
*Cinetus nyx* sp. n. (♀) de la Norvège est décrite et figurée. Cette espèce nouvelle est près proche de *C. proclea* Nixon, 1957.

Buhl, P.N.: Parmagaden 36, st. tv., DK-2300 Copenhagen S., Denmark.

## *Cinetus nyx* sp. n.

Type material. Holotype ♀: Norway (EIS 77, MRI), Norddal, Tafjord, Fjøra, Malaise-trap, 18.VII-11.IX.1993, leg. Oddvar Hanssen. Deposited in the Zoological Museum, University of Oslo. Unique.

Description of the holotype. Runs to the aberrant S. Swedish species *C. proclea* Nixon, 1957 in Nixon's (1957) key and is very similar to this species (cf. Nixon 1957). Differs from *proclea* in having 3rd tergite only as long as basal segment of hind tarsus and in having gaster beyond petiole fully 3 times longer than wide (fig. 1). In *proclea*, third tergite is about 1.25 times longer than basal segment of hind tarsus, and gaster beyond petiole is hardly 2.5 times longer than wide, (cf. Nixon 1957). The widest part of gaster is situated distinctly more anteriorly in *proclea* than in *nyx*, making gaster of *proclea* much different from that of *nyx* in general appearance, compare fig. 272 in Nixon (1957) with fig. 1 in the present description.




Figure 1: Gaster of *Cinetus nyx* sp. n. ♀.

The eight known specimens of *C. proclea* were collected at about the 56° N lat.; *C. nyx* sp. n. was collected at about 62°20'N. Perhaps *nyx* has a more northern distribution than *proclea*.

*C. nyx* is named after the Greek goddess Nyx personifying the night, referring to the dark body colour of the species which probably also prefers shadowy habitats.

I thank Mr. Lars Ove Hansen (Zoological Museum, University of Oslo) for sending me the specimen of *C. nyx*.

### Reference

Nixon, G. E. J., 1957. Hymenoptera Proctotrupoidea. Diapriidae subfamily Belytinae. — *Handbooks for the Identification of British Insects VIII*, 3(dii): 1-107.

---

## Boekbespreking

Ebert, G. (Ed.): *Die Schmetterlinge Baden-Württembergs Band 5 (Nachfalter III), Band 6 (Nachfalter IV)*. 24,5 x 18 cm, deel 5: 575 p., 400 kleurenfoto's, 360 tekstfiguren, 133 verspreidingskaarten; deel 6: 622 p., 512 kleurenfoto's, 433 tekstfiguren, 187 verspreidingskaarten, Verlag Eugen Ulmer, Postfach 70 05 61, D-70574 Stuttgart, gebonden met veelkleurige stofomslag, DEM 98,- per deel (ISBN 3-8001-3481-0 en 3-8001-3482-9).

Nadat in de eerste twee delen uit deze reeks de dagvlinders van Baden-Württemberg behandeld werden, en in de delen 3 en 4 een aanvang werd gemaakt met de bespreking van de nachtvlinders uit dit gebied, zijn nu de twee volgende delen verschenen, eveneens over de nachtvlinders. In deel 5 worden de families Sesiidae, Arctiidae en enkele subfamilies van de Noctuidae besproken door verschillende specialisten terzake. In deel 6 volgen verdere subfamilies van de Noctuidae.

Beide delen zijn op dezelfde wijze opgevat als de vroeger uitgegeven delen in deze reeks. Deel 5 vat aan met een indeling van het besproken gebied in natuurlijke streken, een checklist van de soorten uit de families Sesiidae, Arctiidae en Noctuidae en bespreking van de graad van bedreiging en voorstellen van maatregelen om de meest bedreigde soorten te beschermen.

De bespreking van de afzonderlijke soorten in het systematische deel bevat de volledige naam van de soort met synoniemen en verwijzingen naar literatuurvermeldingen. De algemene verspreiding van de soort wordt aangegeven en de verspreiding in Baden-Württemberg wordt zeer gedetailleerd besproken, met vermelding van de eventuele achteruitgang van de soort (van vooruitgang is jammer genoeg haast nooit sprake!). De verspreiding wordt aangegeven op een kaartje. Er is tevens aandacht voor de verticale verspreiding. In het deel over de fenologie staan gegevens over de vliegtijd van het imago en over de levenswijze van de eerste stadia. In het deeltje over de ecologie vindt men informatie over het biotoop, het voedsel van de rups en het gedrag. In een aparte paragraaf wordt eengegeven of de soort voorkomt in de Rode Lijsten van de Duitse Bondsrepubliek of van Baden-Württemberg. Hierbij geeft men aan of de soort overall, of slechts in enkele gebieden bedreigd is. Tevens wordt gepoogd te achterhalen waarom de soort in bepaalde gebieden achteruitgaat zodat men tevens maatregelen kan nemen om de achteruitgang te vertragen of zelfs te stoppen.

De boeken zijn doorlopend geïllustreerd met tal van prachtige kleurenfoto's van eieren, rupsen of vlinders in de vrije natuur of van geprepareerde exemplaren, ook van biotopen. Diagrammen geven informatie over de vliegtijd en de verticale verspreiding. Elk deel wordt afgesloten met een alfabetische index van de in dat deel behandelde soorten.

Zoals de vorige delen, zijn beide boeken zeer verzorgd uitgegeven. Zij verdienen een plaats in de boekenkast van iedereen die zich met Europese nachtvlinders bezig houdt.

Willy De Prins