

Nephopterix angustella, een nieuwe soort voor de Belgische fauna (Lepidoptera: Pyralidae)

Willy De Prins


Summary. *Nephopterix angustella*, a new species to the Belgian fauna (Lepidoptera: Pyralidae). Four specimens of *Nephopterix angustella* (Hübner, 1796) have been captured in 1992 and 1993 at Wenduine (West Flanders). The species is new for the Belgian fauna.

Résumé. *Nephopterix angustella*, une espèce nouvelle pour la faune belge (Pyralidae: Pyralidae). Quatre exemplaires de *Nephopterix angustella* (Hübner, 1796) furent capturés en 1992 et en 1993 à Wenduine (Flandre occidentale). Cette espèce est nouvelle pour la faune belge.

Key words: *Nephopterix angustella* - faunistics - distribution - Belgium.

De Prins, W.: Diksmuidelaan 176, B-2600 Antwerpen (Belgium).

Op 28.VIII.1992 ving Aubin De Turck een exemplaar van *Nephopterix angustella* (Hübner, 1796) op licht te Wenduine (West-Vlaanderen). Nadien vond hij telkens één exemplaar op 29.IX.1992 (zie figuur 1), 31.V.1993 en op 21.VIII.1993 steeds op dezelfde plaats op licht. Deze Pyralide is nieuw voor de Belgische fauna en moet in de lijst van De Prins (1998) geplaatst te worden op p. 113 tussen de genera *Epischnia* en *Conobathra*.



Figuur 1: *Nephopterix angustella* (Hübner, 1796), Wenduine (West-Vlaanderen) 29.IX.1992, leg. A. De Turck (links $\times 1$, rechts $\times 2$).

In Nederland werd de soort waargenomen in 5 provincies (16 uurhokken). De meeste waarnemingen komen van de kuststreek (Kuchlein 1993). De Belgische waarnemingen sluiten daarop aan.

N. angustella is verspreid in Midden- en Zuid-Europa. De meest noordelijke vindplaatsen liggen in Denemarken en Estland (Speidel 1996).

De rups leeft in de vruchten van *Euonymus europaeus*. Volgens Slamka (1997) vliegt de vlinder in twee generaties van midden april tot november. In onze streken valt de hoofdvliegtijd in juni en juli en kan er een tweede generatie optreden in september en oktober (Goater 1986). De rups overwintert in een los gesponnen cocon in rottend hout.

Met dank aan Aubin De Turck voor het ter beschikking stellen van zijn materiaal en enkele bijkomende inlichtingen.

Literatuur

- De Prins, W., 1998. Catalogue of the Lepidoptera of Belgium. — *Studiedocumenten van het K.B.I.N.* 92: 1-236.
- Goater, B., 1986. British Pyralid Moths. A Guide to their Identification. — Harley Books, Great Horkeley.
- Kuchlein, J. H., 1993. De Kleine Vlinders. Handboek voor de Faunistiek van de Nederlandse Microlepidoptera. — Pudoc, Wageningen.
- Slamka, F., 1997. Die Zünslerartigen (Pyraloidea) Mitteleuropas (2nd edition). — Slamka, Bratislava.
- Speidel, W., 1996. Pyralidae. In: Karsholt, O. & Razowski, J. (eds.): The Lepidoptera of Europe: 166-196. — Apollo Books, Stenstrup.

Corrections to Faquaet, M.: Enkele interessante nachtvlindersoorten uit het departement Vendée in Frankrijk, september 1997 (Lepidoptera) (*Phegea* 26 (1): 23-27)

p. 23 Inleiding, lijn 3 "...35 meest" moet zijn "...34 meest".

Plaat 1 (p. 24): de legende bij figuren 12 en 14 dient omgewisseld. In de tekst moet de verwijzing naar deze figuren aangepast worden: p. 26 soort 23 *Dryobotodes monochroma*: fig. 14 i.p.v. fig. 12 en soort 25 *Dryobotodes tenebrosa*: fig. 12 i.p.v. fig. 14.

Op plaat 1 (p. 24) stelt figuur 21 een ♀ voor en figuur 22 een ♂.