


Korte mededelingen

Een witte vorm van *Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Geometridae)



Figuur 1-4. *Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758); 1.— Witte vorm, Italië, Aosta-dal, Clavel, 1300 m, 28.VIII.1998; 2.— Normaal gekleurde vorm, zelfde vindplaats, 30.VIII.1998; 3.— idem, Italië, Aostadal, Avise 800 m, 4.VI.1997; 4.— idem, Italië, Aostadal, Cerellaz, 1250 m, 30.V.1997.

Op 28.VIII.1998 ving ik een afwijkende vorm van *Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758) op licht, te Clavel in het Aostadal in Noordwest-Italië. De vlinder is vuilwit, alleen de vleugeltoppen zijn nog enigszins geel aangelopen, maar voor de rest zijn de voor- en achtervleugels vuilwit. Het dier is afgebeeld met drie normaal gekleurde exemplaren, eveneens afkomstig uit Clavel of de naaste omgeving (fig. 1).

In zijn catalogus noemt Lempke (1951, 1970) een bleekgele vorm (f. *intermedia* Harrison, 1905). Voor zover ik kon nagaan is een witte vorm onbekend.

Referenties

- Lempke, B. J., 1951. Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera, X. — *Tijdschr. Ent.* 94: 227-320.
Lempke, B. J., 1970. Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera (zestende supplement). — *Tijdschr. Ent.* 113: 125-252.

(Johannes Slot, Rembrandtlaan 10, NL-3941 CH Doorn)

Een late vangst van *Xestia baja* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera: Noctuidae)

Op 23.IX.1998 ving ik een exemplaar van *Xestia baja* ([Denis & Schiffermüller], 1775) op smeer. Deze late waarneming vond plaats tijdens een inventarisatieonderzoek te Bornia, gemeente Driebergen (Nederland). Het gemengde bos Bornia is eigendom van het Utrechts Landschap, een Natuurbeschermingsorganisatie. Bornia is rijk aan naaldhout, maar bij de ingangen staat veel gemengd bos met vooral eiken (*Quercus*), berken (*Betula*) en beuken (*Fagus*). Het exemplaar van *X. baja* zat op smeer, aangebracht op de stam van een oude beuk.